



ANAMNESIS SOBRE ANTECEDENTES DE SALUD PERSONALES Y FAMILIARES

Guía de Recursos para la Atención Sanitaria y Alfabetización en Salud a
Personas Refugiadas y Migrantes en Andalucía

Febrero 2024

<p>General</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Edad y sexo. • Antecedentes personales y familiares. Enfermedades previas con especial atención a infecciosas y patología crónica, cirugías previas, alergias, transfusiones. • Inmunizaciones previas. Valorar si tiene antecedentes de administración de vacuna frente a la tuberculosis (BCG) y a COVID-19 • Alergias medicamentosas o alimentarias. • Hábitos tóxicos y prácticas de riesgo. • Uso de métodos anticonceptivos en hombres y mujeres en edad reproductiva, especialmente entre lo/as más jóvenes, y diagnóstico de ITS. • Historia farmacológica (remedios propios, fitoterapia, etc.) y tratamientos previos, especialmente en TB y ITS (sobre todo sífilis). • Antecedentes de transfusiones o inyecciones parenterales en el país de origen. • Historia de pruebas complementarias realizadas.
<p>En mujeres</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Historia ginecológica y obstétrica y episodios de enfermedades inflamatorias pélvicas. • Anticoncepción: valoración del uso de recursos no farmacológicos (remedios propios, naturales, etc.). • Interrupciones voluntarias de embarazo. • Violencia de género, violación y abuso sexual. • Trata de seres humanos. • Mutilación genital femenina.
<p>En infancia y adolescencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recoger antecedentes del embarazo y parto, vacunas en la infancia y antecedentes familiares. • Conocer si el embarazo fue controlado, ante la posibilidad de infecciones de transmisión perinatal. • Datos sobre el parto, peso-talla al nacer y si hubo reanimación neonatal. • Realización de las pruebas metabólicas para la detección precoz de errores congénitos (fenilcetonuria e hipotiroidismo). • Existencia de enfermedades previas, febriles, diarrea, vómitos, etc., o si ha precisado tratamiento parenteral o profilaxis antimalárica. • Existencia de antecedentes familiares de anemias hemolíticas o déficit de lactasa. • Escrutinio hipoacusia del recién nacido/niño. • Detección de problemas en el desarrollo y problemas emocionales.